



0-X éves férfiak és nők halálozása a daganat lokalizációja szerint a Mosonmagyaróvári Járásban 2008-2012.

Férfiak



Nők




Mindkét nem esetében a legtöbb rosszindulatú daganatos halálozás a légcső, hörgő, tüdő daganatos megbetegedése miatt következik be, ami igazoltan 70-90%-ban –férfiak közt nagyobb arányban- a dohányzással összefüggésben alakul ki.

Ezt követően a legnagyobb haláloki súlya a vastag-, és végbél daganatainak van, ami szűrhető daganatként, az azon való részvétellel jó eséllyel megelőzhető lenne.

A női daganatos halálozás 59%-a, a férfi 62%-a primer vagy szekunder prevencióval megelőzhető vagy elkerülhető lenne!!

Rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, Győr-Moson-Sopron Megyében és a Mosonmagyaróvári Járásban

(1996-2012) SHA/100000 fő



A férfiak halálozása 2003-ig a megyei és országos szintet is meghaladó, az ezt követő erőteljes csökkenés (35%-os) eredményeként a járásban elő férfiak mortalitása a megyei szint alá esett vissza.



A női mortalitás alakulását a lassú, de tartós emelkedés jellemzi az ezredfordulót követően (19%-os), aminek következtében az időszak végére, a járásban, a női halálozás a hazai átlag fölé emelkedett.

Rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli Régió településein,

Férfi

(Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHH) , 2008-2012

Nő



A halandóság országos referencia szinttől való eltérése nők esetében nem írható le, férfiak esetében statisztikailag nem igazolható.

Egyes rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta korai halálozás területi egyenlőtlenségei az országos átlaghoz képest a Mosonmagyaróvári Járásban

(Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHH) (2008-2012)


A mosonmagyaróvári nők méhnyak rosszindulatú daganata miatti halandósága szignifikánsan 70%-kal meghaladja az országos szintet. Kedvezőtlen, hogy a jelenség hosszú ideje fennáll, kedvező viszont, hogy a többlethalálozás mértéke jelentősen mérséklődött.

A kimlei és jánossomorjai férfiak ajak, szájüreg, garat daganatos halálozása igazolhatóan az országos átlagot 20-30%-al meghaladja.

Betegségcsoport	Nemek	Országos átlag alatti halálozás 2008-2012		Országos átlag feletti halálozás 2008-2012	
		Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHH értéke, szignifikancia (Posterior probability) szintje	Település megnevezése	Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHH értéke, szignifikancia (Posterior probability) szintje	Település megnevezése
Rosszindulatú daganatok	férfi	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	
	nő	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	
Légcső, hörgő tüdő rosszindulatú daganata	férfi	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	
	nő	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	
Vastagbél, végbél rosszindulatú daganata	férfi	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	
	nő	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	
Emlő rosszindulatú daganata	nő	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	
Méhnyak rosszindulatú daganata	nő	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		170,9% (0,81)	Mosonmagyaróvár
Prostata rosszindulatú daganata	férfi	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	
Ajak, szájüreg, garat rosszindulatú daganata	férfi	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		107,2% (0,86)	Mosonmagyaróvár
		nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		119,5% (0,81)	Kimle
		nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		131,6% (0,91)	Jánossomorja
	nő	nincs szignifikánsan országos átlag alatti mortalitású település		nincs szignifikánsan országos átlag feletti mortalitású település	

Az emésztőrendszer betegségei miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, Győr-Moson-Sopron Megyében és a Mosonmagyaróvári Járásban

(1997-2010) SHA/100000 fő




A férfiak korai halandósága 14%-kal, a nőké 48%-kal csökkent a teljes időszak alatt.

Férfiak körében azonban 2005-től drasztikus, 45%-os emelkedés kezdődött, aminek eredményeként a járás mortalitása közel 50%-kal meghaladja a hazai átlagot.

Az emésztőrendszer betegségei miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli régió településein, (Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHH),2008-2012

Férfi

Nő



Jelmagyarázat

Posterior_ProbabilitiesMales

PP

0.80 - 0.89

0.90 - 0.94

0.95 - 1.0

Standardizált Halálozási Hányados

Simított érték



Országosnál jelentősen alacsonyabb



Országosnál alacsonyabb



Országos körüli, de alacsonyabb




Országos körüli, de magasabb



Országosnál magasabb




Országosnál jelentősen magasabb



A Kimlén, Darnózsolin, Ásványrárón és Jánossomorján élő férfiak mortalitása a hazai referencia szintet 50-60%-al szignifikánsan meghaladja.
A járás esetében korábban nem mutatkozott a problémának ilyen mértéke.

Az alkoholos májbetegség miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, Győr-Moson-Sopron Megyében és a Mosonmagyaróvári Járásban

(1997-2010) SHA/100000 fő



Annak ellenére, hogy a teljes időszakot figyelembe véve, mindkét nemből csökkenő tendenciájú a mortalitás,


drámai a férfiak között 2005 óta bekövetkezett 75%-os mortalitás emelkedés, illetve hogy a női halálozás a teljes időszak alatt a hazai szint feletti.

A férfiak alkoholos májbetegség miatti halálozása a Nyugat-dunántúli régió településein,

(Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHH), 2008-2012

0-64 éves


65-X éves



Nincs olyan település ahol a férfiak korai alkoholos májbetegség miatti halálozása ne haladná meg a hazai átlagot, ami a települések felében statisztikailag is igazolható. A többlethalálozás mértéke 50-200% közötti. Legmagasabb Ásványráró, Kimle és Darnózseli településeken, ahol az országos átlag duplája.

Ez a probléma is körvonalazódott már korábbi jelentésünkben, de most vált igazán hangsúlyossá és beavatkozást sürgetővé!!

A légzőrendszer betegségei miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, Győr-Moson-Sopron Megyében és a Mosonmagyaróvári Járásban (1996-2012) SHA/100000 fő




A kis esetszámok okozta torzító hatás miatt messzemenő következtetés nem vonható le.

A légzőrendszer betegségei miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli régió településein, (Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHH), 2008-2012

Férfi

Nő



Jelmagyarázat

Posterior_ProbabilitiesMales

PP

0.80 - 0.89

0.90 - 0.94

0.95 - 1.0

standardizált Halálozási Hányado:

imittott érték

Országosnál jelentősen alacsonyabb


Országosnál alacsonyabb

Országos környéki, de alacsonyabb

Országos környéki, de magasabb


Országosnál magasabb

Országosnál jelentősen magasabb



A Lébényben élő nők mortalitása igazolhatóan 80%-kal meghaladja a magyar átlagot.

Morbiditás és mortalitás külső okai miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, Győr-Moson-Sopron Megyében és a Mosonmagyaróvári Járásban (1996-2012) SHA/100000 fő



Az országos átlag alatti, a megyei mortalitási szinthez közeli női halálozás.

Bár a teljes időszak alatt a férfi halálozás trendje is kedvező, kezdeti problémát is jelezhet a 2007 óta tartó -26%-os-emelkedés.

Motoros járműbalesetek illetve a szándékos önártalom miatti korai halálozás a Mosonmagyaróvári Járásban

(SHA/100 000 fő) (1996-2012)

- A motoros járműbalesetek miatti korai halálozás nők esetében 2004 óta tartósan a hazai átlag feletti.
- A szándékos önártalom miatti korai halálozás férfiak nők körében közel duplájára, nők körében négyszeresére emelkedett.

Dohányzással összefüggésbe hozható, a primer prevencióval és gyógyító megelőző ellátással befolyásolható halálozás a Mosonmagyaróvári Járásban

(SHA/100 000 fő) (1996-2012)

- A férfiak dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozása 27%-os, a nőké 11%-os csökkenést mutat. A csökkenés az időskorú lakosság körében is leírható, ám mindkét nem halálozása tartósan a hazai átlag feletti. 65 év előtt Jánossomorján és Újrónafőn, 65 év felett Kimlén és Mosonmagyaróváron történik országos átlag feletti halálozás.
- A férfiak elsősorban eredményes primer prevenció által befolyásolható korai halálozása, a 2005 óta tartó emelkedés következtében az időszak végére az országos átlagot is meghaladja.
- A nők túlnyomóan a gyógyító-megelőző ellátás tevékenysége révén elkerülhető halálozása 2003 óta 14%-kal emelkedett.